

LE DICAMBA PAR ALBAUGH

Bueno[®]
480 SL

- ✓ Herbicide sélectif utilisé en post émergence pour contrôler les dicotylédones vivaces et annuelles
- ✓ Efficace, flexible, fiable
- ✓ Utilisation autorisée sur le maïs, sur chaume, pour le désherbage avant mise en culture, dans les prairies et pour limiter la croissance et la fructification dans les jachères semées
- ✓ Le partenaire de choix dans votre programme de désherbage



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS: UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRECAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

Bueno[®]

480 SL


480 g/L de dicamba - Concentré soluble (SL)

PERFORMANCES VALIDEES

Bueno[®] 480 SL est une nouvelle formulation de dicamba développée par Albaugh Europe. Son efficacité a été testée au travers de 25 essais conduits dans 15 pays couvrant toutes les zones climatiques européennes. En ce qui concerne la sélectivité, 27 essais ont été réalisés dans différents pays européens (19 en maïs grain et 8 en maïs ensilage).

Aucune différence n'a été observée entre la formulation de dicamba 480 SL de référence et **Bueno[®] 480 SL**.

EFFICACITE COMPAREE (25 essais Albaugh)



Usages	Dose max d'emploi	Stade et conditions d'application	Délai avant récolte	ZNT aquatique	ZNT plantes non cibles
Graminées fourragères- Désherbage	1 L/ha	À partir du stade BBCH 30, de mars à juin Délai rentrée du bétail: 14 jours	14 j	5	5
Jachères et cultures intermédiaires - Limitation de la pousse et de la fructification	0.6 L/ha	Sur moutarde blanche, phacélie, trèfle blanc, trèfle de perse, trèfle incarnat	Non applicable	5	5
Jachères et cultures intermédiaires - Limitation de la pousse et de la fructification	0.3 L/ha	Sur trèfle violet et vesce commune	Non applicable	5	5
Maïs - Désherbage	0.6 L/ha	Entre les stades BBCH 12 et 19 Jets dirigés sur le rang avec pendillards autorisés	BBCH 19	5	5
Prairies – Désherbage	1 L/ha	De mars à juin puis août à octobre Délai rentrée du bétail: 14 jours	14 j	5	5
Traitement généraux – Désherbage avant mise en culture	0.6 L/ha	De juin à octobre	Non applicable	5	5

Sur maïs, **Bueno[®] 480 SL** est le partenaire idéal pour renforcer son programme anti-dicots classique (par exemple à base de mésotrione) en particulier contre les dicots vivaces. Se référer à la réglementation en vigueur.

Le saviez-vous?

Bueno[®] 480 SL est une solution intéressante en intercultures pour le contrôle des vivaces telles que les chardons, liserons, rumex. Utilisable entre juin et octobre, il sera d'autant plus efficace que ces adventices seront à un stade suffisamment développé : liserons au stade 20-30 cm, rumex au stade rosette et chardons au stade boutons.

Se référer à l'étiquette du produit pour plus de détails.



Bueno[®] 480 SL AMM No 2180233. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi, se référer à l'étiquette du produit ou www.phytodata.com. Détenteur et responsable de la mise sur le marché: Albaugh TKI d.o.o., Grajski trg 21, SI-2327 Rače, Slovenie.

www.albaugh.eu

 **Albaugh[™]**
Your Alternative[™]

™ trademark or trade name of Albaugh, LLC or an affiliated company